

* Insbesondere Personen mit Immunsuppression, z. B. organtransplantierte Personen, Personen unter (schwerer) immunsuppressiver Therapie oder Patient:innen mit (schwerem) diagnostiziertem Immundefizienzsyndrom. Auch ein Alter > 65 Jahren oder eine hohe Zahl an Komorbiditäten erhöhen das Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf.^{2,3}

1. Xie Y et al. Association of Treatment With Nirmatrelvir and the Risk of Post-COVID-19 Condition. *JAMA Intern Med.* 2023 Jun 1;183(6):554-564.
2. S3-Leitlinie Empfehlungen zur Therapie von Patienten mit COVID-19, Registernummer 113 – 001 AWMF Leitlinienregister.
3. Li J, Zhou Y, Ma J, et al. The long-term health outcomes, pathophysiological mechanisms and multidisciplinary management of long COVID. *Signal Transduct Target Ther.* 2023;8(1):416. Published 2023 Nov 1. doi:10.1038/s41392-023-01640-z
4. Lee H, Kim BG, Jeong CY, et al. Long-Term Impacts of COVID-19 on Severe Exacerbation and Mortality in Adult Asthma: A Nationwide Population-Based Cohort Study. *J Allergy Clin Immunol Pract.* 2024;12(7):1783-1793.e4. doi:10.1016/j.jaip.2024.03.035