

## Patientenkarte zur sicheren Anwendung

### XELJANZ® (Tofacitinib)

- Diese Patientenkarte enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie vor Beginn der Einnahme von Tofacitinib und während der Behandlung mit Tofacitinib kennen müssen. Wenn Sie diese Informationen nicht verstehen, bitten Sie Ihren Arzt oder Apotheker, Ihnen diese Informationen zu erklären.
- Tragen Sie diese Patientenkarte bei sich und zeigen Sie ihn jedem an Ihrer Behandlung beteiligten Arzt oder Apotheker.

- Lesen Sie auch die Packungsbeilage von Tofacitinib und wenden Sie Tofacitinib gemäß den Angaben in der Packungsbeilage an.

**Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker über ALLE Arzneimittel**, die Sie einnehmen, einschließlich verschreibungspflichtiger und nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel, Vitamine und pflanzlicher Präparate.

Einige Arzneimittel sollten nicht zusammen mit Tofacitinib eingenommen werden, da die gleichzeitige Einnahme die Konzentration von Tofacitinib in Ihrem

Körper verändern kann. Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, die einen der folgenden Wirkstoffe enthalten:

- Antibiotika wie z. B. Rifampicin, die zur Behandlung bakterieller Infektionen angewendet werden
- Fluconazol und Ketoconazol, die zur Behandlung von Pilzinfektionen angewendet werden

Tofacitinib sollte nicht zusammen mit bestimmten anderen Arzneimitteln, die Ihr Immunsystem schwächen (z. B. Biologika, Azathioprin, Mercaptopurin,

Tacrolimus oder Ciclosporin) angewendet werden. Die Einnahme von Tofacitinib mit diesen Arzneimitteln kann Ihre Immunabwehr schwächen und das Infektionsrisiko erhöhen. Bei der Kombination von Tofacitinib mit Methotrexat können Nebenwirkungen häufiger auftreten als bei der Therapie mit Tofacitinib.

Tofacitinib kann bei Ihnen das Risiko für schwere Infektionen erhöhen. Sie können ein erhöhtes Risiko für Infektionen haben, wenn Sie Diabetes, chronische Lungenerkrankung haben oder Kortikosteroide einneh-

men. Ihre Behandlung mit Tofacitinib kann von Ihrem Arzt unterbrochen werden.

Es gibt Berichte von Patienten, die mit Tofacitinib behandelt wurden und einen Herzinfarkt hatten. Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, wenn Sie Herzprobleme, Bluthochdruck oder einen hohen Cholesterinspiegel haben und wenn Sie Raucher sind oder waren.

Tofacitinib kann Ihr Risiko für bestimmte Krebsarten erhöhen. Lymphome, Lungenkrebs, nicht-melanozytärer Hautkrebs und andere Krebsarten wurden

bei Patienten, die mit Tofacitinib behandelt wurden, berichtet. Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, wenn Sie schon einmal an einer Krebsart erkrankt waren und auch wenn Sie derzeit oder in der Vergangenheit geraucht haben.

## Während der Behandlung mit Tofacitinib

Informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt,

- wenn Sie plötzlich kurzatmig werden oder Atembeschwerden, Schmerzen in der Brust oder im oberen Rücken, Schwellungen in einem Bein oder Arm, Beinschmerzen oder Berührungsempfindlichkeit oder Rötung oder Verfärbungen in einem Bein oder Arm bemerken, während Sie Tofacitinib einnehmen, da dies Anzeichen für ein Blutgerinnsel in der Lunge oder in den Venen sein können

- wenn bei Ihnen Symptome einer Infektion wie Fieber, anhaltender Husten, Gewichtsverlust oder starke Müdigkeit auftreten
- wenn Sie starke Schmerzen in der Brust (die sich auf Arme, Oberbauch, Kiefer, Nacken, Rücken oder Schulterblätter ausbreiten können) oder Engegefühl in der Brust, Kurzatmigkeit, kalten Schweiß, Benommenheit, plötzlichen Schwindel, Übelkeit, Erbrechen oder Schmerzen im Oberbauch entwickeln
- wenn Sie eine Schwellung der Lymphknoten in Ihrem Hals, den Achselhöhlen oder der Leistengegend; per-

manente Müdigkeit; Fieber; nächtliches Schwitzen; anhaltenden oder sich verschlimmernden Husten; Schwierigkeiten beim Atmen; Heiserkeit oder pfeifendes Atmen oder unklaren Gewichtsverlust entwickeln

- wenn sich bei Ihnen Symptome eines Herpes zoster, wie z. B. ein schmerzhafter Hautausschlag oder Blasen bilden
- wenn Sie engen Kontakt zu einer an Tuberkulose erkrankten Person hatten
- wenn Sie neue oder Veränderungen bestehender Muttermale oder Leberflecken bemerken

- wenn sich Symptome einer interstitiellen Lungenerkrankung, wie z. B. Kurzatmigkeit zeigen
- wenn Sie Anzeichen oder Symptome von abdominalen Komplikationen bemerken, wie Bauchschmerzen, Unterleibsschmerzen, Blut im Stuhl oder jegliche Veränderungen der Darmtätigkeit, die mit Fieber einhergehen
- wenn Sie eine Gelbfärbung der Haut bemerken, oder Übelkeit oder Erbrechen auftreten

- wenn noch eine Impfung aussteht. Während der Einnahme von Tofacitinib sollten Sie bestimmte Impfstoffe nicht erhalten
- wenn Sie schwanger werden oder eine Schwangerschaft planen. Tofacitinib darf nicht während der Schwangerschaft angewendet werden. Frauen im gebärfähigen Alter sollten während der Behandlung mit Tofacitinib und für mindestens 4 Wochen nach der letzten Dosis eine wirksame Verhütung anwenden
- wenn Sie stillen. Frauen dürfen während der Behandlung mit Tofacitinib nicht stillen.



<http://www.bfarm.de/schulungsmaterial>

### Weitere Informationen (bitte ausfüllen)

Name des Patienten: \_\_\_\_\_

Name des Arztes: \_\_\_\_\_

Telefonnummer des Arztes: \_\_\_\_\_

Wenn Sie die Einnahme von Tofacitinib beenden, tragen Sie diese Patientenkarte noch mindestens 2 Monate nach der letzten Dosis Tofacitinib bei sich.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Patientenkarte unter [www.pfizermed.de/de/xeljanz-patientenmaterial](http://www.pfizermed.de/de/xeljanz-patientenmaterial) herunterzuladen.

Version: 07, Genehmigungsdatum: Februar 2022